

## MATEMATICA AL COMPUTER

# Derivate

Con un software di geometria dinamica costruiamo un disegno che ci permetta di determinare l'equazione della tangente al grafico della funzione  $f(x) = 10(x-1)^2 e^{-x}$  in un suo punto  $T$ . Proviamo con  $x_T = 2,50$ .

### RISOLUZIONE

- Creiamo una *slider* alla quale diamo il nome  $x_T$ .
- Per immettere, sia nella finestra algebrica (figura 1) sia nella zona del disegno (figura 2), gli altri elementi necessari alla soluzione del problema, nella riga di inserimento:

| digitiamo:                   | per dare               |
|------------------------------|------------------------|
| $f(x)=10*(x-1)^2 * e^{(-x)}$ | la funzione $f(x)$     |
| $T = (x_T, f(x_T))$          | il punto $T$           |
| Derivata $[f(x)]$            | la derivata di $f(x)$  |
| $m = g(x_T)$                 | il coefficiente $m$    |
| $t: y = m*(x-x_T)+f(x_T)$    | la tangente $t$ in $T$ |

seguiti ogni volta dal tasto INVIO.

Teniamo conto che:

- selezioniamo il simbolo  $e$ , il numero di Nepero, dalla tendina dei caratteri speciali con un clic su di esso e l'operatore *Derivata* da quella dei comandi;
- il sistema dà il nome  $g(x)$  alla derivata.
- Poi facciamo clic sul corsoio della *slider* e lo spostiamo con il tasto freccia opportuno sino a raggiungere il valore 2,5 (quello proposto dal problema), in modo da leggere l'equazione della tangente. Se spostiamo ulteriormente il corsoio della *slider*, appaiono altre tangenti della curva.




Figura 1




Figura 2

### ESERCIZI IN PIÙ

Per ognuna delle seguenti funzioni costruisci un foglio per ricavare le equazioni delle eventuali tangenti e per tracciarne il grafico. Prova il foglio con i punti indicati. Sul quaderno determina le equazioni delle tangenti che esistono e confrontale con i risultati ottenuti al computer.

- 1  $h(x) = \ln x$ ;  $x_T = -1, 1, e$ .
- 2  $f(x) = -\frac{1}{x}$ ;  $x_T = 0, 1, \frac{5}{2}$ .
- 3  $g(x) = \frac{2x+3}{x+1}$ ;  $x_T = -2, -1, 0$ .
- 4  $t(x) = \frac{4x+2}{x^3+x}$ ;  $x_T = -2, -1, \frac{1}{2}$ .
- 5  $r(x) = \sqrt{1-x}$ ;  $x_T = -3, 0, 1$ .
- 6  $s(x) = \sin x$ ;  $x_T = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$ .