

LABORATORIO DI MATEMATICA

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI

■ Le equazioni irrazionali

ESERCITAZIONE GUIDATA

Con l'aiuto di Derive discutiamo il numero delle soluzioni reali che può avere la seguente equazione irrazionale

$$\sqrt{x+h} = 2x+2$$

al variare del parametro reale h .

Le soluzioni dell'equazione in funzione di h

- Entriamo in ambiente Derive, diamo *Crea_Espressione* e digitiamo nella riga di editazione delle espressioni l'equazione $\text{SQRT}(x+h) = 2 \cdot x + 2$. Con **OK** la inseriamo nell'etichetta #1 della zona algebrica (figura1).
- Derive non risolve l'equazione irrazionale non conoscendo i valori del parametro h . Battiamo, allora, il tasto **F4** importando l'equazione dalla zona algebrica alla riga di editazione delle espressioni fra parentesi. A fianco scriviamo $\wedge 2$, per elevare al quadrato entrambi i membri dell'equazione ed eliminare la radice.
- Con **OK** la inseriamo nella #2.
- Usiamo *Risolvi_Espressione*, nella cui finestra di dialogo confermiamo l'equazione e usciamo con *Semplifica*, ottenendo nella #3 l'impostazione e nella #4 le soluzioni dell'equazione in funzione di h . Adesso verifichiamo se quelle trovate sono soluzioni accettabili dell'equazione originale.

#1: $\sqrt{(x+h)} = 2 \cdot x + 2$

#2: $(\sqrt{(x+h)} = 2 \cdot x + 2)^2$

#3: $\text{SOLVE}((\sqrt{(x+h)} = 2 \cdot x + 2)^2, x)$

#4: $x = \frac{\sqrt{(16 \cdot h - 15)} - 7}{8} \vee x = -\frac{\sqrt{(16 \cdot h - 15)} + 7}{8}$

◀ Figura 1

Le condizioni di esistenza delle soluzioni

Imponiamo le condizioni affinché l'equazione sia soddisfatta. Nel nostro caso sono: la condizione di esistenza del radicale, ovvero poniamo il radicando maggiore o uguale a 0, e la condizione che il secondo membro dell'equazione sia maggiore o uguale a 0.

- Dopo averlo evidenziato con dei clic successivi sull'equazione contenuta nella #1, importiamo nella riga di editazione il radicando $x+h$, a fianco battiamo ≥ 0 , imponendo la condizione di esistenza del radicale, e lo inseriamo nella #5 (figura 2).
- Con *Risolvi_Espressione* ricaviamo nella #6 l'impostazione e nella #7 la soluzione della disequazione.
- Analogamente, operiamo per stabilire quando il secondo membro dell'equazione è positivo, come vediamo nella #8, nella #9 e nella #10.

#5: $x + h \geq 0$

#6: $\text{SOLVE}(x + h \geq 0, x)$

#7: $x \geq -h$

#8: $2 \cdot x + 2 \geq 0$

#9: $\text{SOLVE}(2 \cdot x + 2 \geq 0, x)$

#10: $x \geq -1$

◀ Figura 2

Esercitazioni

Le equazioni irrazionali con parametro

Con l'aiuto del computer discuti il numero delle soluzioni reali che possono avere le seguenti equazioni irrazionali al variare del parametro reale k .

- 1** $\sqrt{x-1} = h - x$ [$h \geq 1$: una sol.; $h < 1$: nessuna sol.]
- 2** $\sqrt{hx - x^2} = x$ [$h < 0$: una sol.; $h = 0$: una sol. doppia; $h > 0$: due sol.]
- 3** $\sqrt{1+x^2} = -\frac{4x+h}{5}$ [$h < -3$: due sol.; $h = -3$: una sol. doppia; $h > -3$: nessuna sol.]
- 4** $\sqrt{1-3x} = x - h$ [$h \leq \frac{1}{3}$: una sol.; $h > \frac{1}{3}$: nessuna sol.]
- 5** $\sqrt{hx+4} = x - 1$ [$h \geq 4$: una sol.; $h < 4$: nessuna sol.]

■ Le disequazioni

Il simbolo di assegnazione

In ambiente Derive, con il simbolo di assegnazione $:=$ (due punti uguale) possiamo dare un nome a un'espressione.

ESERCITAZIONE GUIDATA

Cerchiamo gli zeri del polinomio $3k^3 - 12k$.

- Con *Crea_Espressione* scriviamo $p := 2 * k^3 - 12 * k$ e battiamo INVIO. In tal modo diamo il nome p al polinomio $3k^3 - 12k$ (figura 1).
- Scriviamo la funzione SOLVE ($p = 0, k$) e con INVIO la immettiamo nella #2.
- Diamo *Semplifica_Base* trovando nella #3 gli zeri del polinomio.

```
#1:  p := 3·k3 - 12·k
#2:  SOLVE(p = 0, k)
#3:  k = -2 ∨ k = 2 ∨ k = 0
```

▲ Figura 1 Un esempio di assegnazione.

L'assegnazione di un nome a un'espressione rimane attiva all'interno del file nel quale l'abbiamo realizzata, anche se cancelliamo l'etichetta che la contiene. Se desideriamo togliere un'assegnazione, per esempio quella al nome p , scriviamo l'espressione $p :=$ e la inseriamo nella zona algebrica. Il solo simbolo di uguale ($=$) non vincola in alcun modo le grandezze coinvolte.

ESERCITAZIONE GUIDATA

Con l'aiuto di Derive discutiamo il tipo delle soluzioni della disequazione

$$(3h + 3)x^2 - 3hx - 8h - 3 \geq 0,$$

in relazione ai valori del parametro reale h . Per verifica sostituiamo poi a h un valore appartenente a ognuno degli intervalli risultati dalla discussione e risolviamo le corrispondenti disequazioni.

L'analisi del problema

Redigiamo uno schema che indichi le diverse tipologie delle soluzioni della disequazione $ax^2 + bx + c \geq 0$, in relazione ai valori che assumono il coefficiente a di x^2 e il discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$.

Se	la disequazione $ax^2 + hx + c \geq 0$ ammette soluzioni che sono
$a > 0$ e $\Delta > 0$,	esterne all'intervallo delle radici, estremi compresi;
$a > 0$ e $\Delta \leq 0$,	date da \mathbb{R} ;
$a = 0$,	quelle di una disequazione di primo grado;
$a < 0$ e $\Delta > 0$,	interne all'intervallo delle radici, estremi compresi;
$a < 0$ e $\Delta = 0$,	date da un solo valore di x ;
$a < 0$ e $\Delta < 0$,	date da \emptyset (l'insieme vuoto).

I dati della disequazione

- Diamo *Crea_Espressione* per scrivere la disequazione e battiamo INVIO per immetterla nell'etichetta #1 della zona algebrica (figura 2).
- Per assegnare il nome a all'espressione $3h + 3$, che rappresenta il coefficiente di x^2 , sulla riga di editazione scriviamo $a :=$ e importiamo dalla zona algebrica alla riga di editazione l'espressione $3h + 3$. Per farlo, di seguito facciamo clic sull'etichetta #1, sul primo membro della disequazione, sul suo primo termine, sul coefficiente di x^2 , sulla riga di editazione e battiamo il tasto F3.
- Costruita l'assegnazione $a := 3h + 3$, con INVIO la immettiamo nella #2.
- Assegniamo il nome DELTA all'espressione che rappresenta il discriminante della disequazione in funzione di h , scrivendo nella riga di editazione

$$\text{DELTA} := (-3h)^2 - 4(3h + 3)(-8h - 3)$$
 e battendo INVIO.
- Posizionando opportunamente il puntatore e dando *Inserisci_Testo*, scriviamo alcune didascalie.

```

La disequazione
#1: (3·h + 3)·x2 - 3·h·x - 8·h - 3 ≥ 0
Il coefficiente a
#2: a := 3·h + 3
Il discriminante
#3: DELTA:=(-3·h)2 - 4·(3·h+3)·(-8·h-3)
    
```

▲ Figura 2 La disequazione, il coefficiente di x^2 e il discriminante.

Le soluzioni dei vari casi

- Per impostare la soluzione del primo caso dello schema, scriviamo nella riga di editazione SOLVE([$a > 0$, DELTA > 0], h) e battiamo INVIO (figura 3).
- Diamo *Semplifica_Base*, Derive risolve il sistema di disequazioni e mostra la soluzione nella #5.
- Operiamo similmente per ricavare le soluzioni degli altri casi.
- Osserviamo, leggendo la #13 e la #15, che i casi, corrispondenti al coefficiente a negativo assieme al discriminante nullo o negativo, non si verificano per alcun valore di h .

Alcune verifiche

- Per svolgere rapidamente alcune verifiche, usiamo la funzione di Derive VECTOR. In essa inseriamo l'impostazione della soluzione della disequazione, il parametro h e i valori che intendiamo che esso assuma. Scegliamo tali valori in modo che ognuno appartenga a un diverso intervallo fra quelli ottenuti nella discussione, prendiamo per esempio -2 , -1 , $-\frac{9}{10}$, $-\frac{1}{2}$, 0 . Se i valori della variabile che desideriamo sostituire nell'espressione non variano con regolarità, dobbiamo scrivere la funzione con la sintassi VECTOR(*espr*, *var*, v), dove v è l'insieme dei valori, posti fra parentesi quadre, che la variabile *var* deve assumere all'interno dell'espressione *espr*.

```

La soluzione dei vari casi
#4: SOLVE([a > 0, DELTA > 0], h)
#5: [-1 < h < -6/7, h > -2/5]
#6: SOLVE([a > 0, DELTA ≤ 0], h)
#7: [-6/7 ≤ h ≤ -2/5]
#8: SOLVE(a = 0, h)
#9: h = -1
#10: SOLVE([a < 0, DELTA > 0], h)
#11: [h < -1]
#12: SOLVE([a < 0, DELTA = 0], h)
#13: []
#14: SOLVE([a < 0, DELTA < 0], h)
#15: []
    
```

▲ Figura 3 Le soluzioni dei vari casi.

• Diamo, quindi, *Crea_Espressione*, digitiamo l'espressione

VECTOR([SOLVE(3*(h + 1)*x^2 - 3*h*x - 8*h - 3 ≥ 0, x)], h, [-2, -1, -9/10, -1/2, 0])

e battiamo INVIO inserendola nell'etichetta #16 (figura 4).

• Con *Semplifica_Base* la facciamo operare, ricavando nella #17 le corrispondenti soluzioni della disequazione.

```

Alcune verifiche
#16: VECTOR([SOLVE(3*(h+1)*x^2 - 3*h*x - 8*h - 3 ≥ 0, x)], h, [-2, -1, -9/10, -1/2, 0])
#17: [
    1 - 4*sqrt(3)/3 ≤ x ≤ 4*sqrt(3)/3 + 1
    x ≥ -5/3
    x ≤ -7 ∨ x ≥ -2
    true
    x ≤ -1 ∨ x ≥ 1
    ]
    
```

◀ Figura 4 Alcune verifiche.

Osservazione

Notiamo che per $h = -2$ le soluzioni sono interne all'intervallo delle radici, per $h = -1$ otteniamo le soluzioni della disequazione lineare, per $h = -\frac{9}{10}$ e per $h = 0$ le soluzioni sono esterne all'intervallo delle radici, per $h = -\frac{1}{2}$ la risposta *true* (vero) indica che la disequazione è sempre vera, cioè le soluzioni sono date da \mathbb{R} .

Esercitazioni

Con l'aiuto del computer discuti il tipo delle soluzioni delle seguenti disequazioni, in relazione ai valori reali del parametro h , e svolgi delle verifiche.

1 $\frac{3(2x - h)}{h + 1} < \frac{x}{h^2 - 1}$

2 $2(h^3 - h)x^2 + 2(h - 1)x + 3 < 0$

3 $\frac{h - 1}{h + 3}x^2 - 2x + 2 \geq 0$

4 $\frac{hx - h - 1}{x^2 - 2x - 3} > 0$

Le disequazioni lineari

Risolvi le seguenti disequazioni lineari con l'aiuto del computer, svolgendo i vari passi, e infine controlla il risultato (se usi *Derive*, puoi farlo con il comando *Risolvi_Espressione*).

5 $10x + 8 < 7x - 24$ $\left[x < -\frac{32}{3} \right]$

6 $25x - 32 \geq 40x - 62$ $[x \leq 2]$

7 $\frac{4}{5}x - \frac{2}{3} > \frac{2}{3}x - \frac{6}{25}$ $\left[x > \frac{16}{5} \right]$

8	$\frac{5}{4}x - 2 > 2x - \frac{2}{5}$	$\left[x < -\frac{32}{15} \right]$
9	$\frac{7}{5}x + \frac{25}{9} < \frac{1}{2}x - \frac{7}{15} + \frac{19}{10}x$	$\left[x > \frac{146}{45} \right]$
10	$\frac{28}{27}x - \frac{7}{12} \leq \frac{5}{24}x - \frac{35}{72}$	$\left[x \leq \frac{21}{179} \right]$
11	$\frac{4}{405}x - \frac{7}{234} > \frac{2}{543}x - \frac{1}{825}$	$\left[x > \frac{3008763}{649220} \right]$
12	$\frac{354}{4}x - \frac{2048}{9} > \frac{2500}{3}x - \frac{653}{6}$	$\left[x < -\frac{2137}{13407} \right]$

Le disequazioni irrazionali

Risolvi con l'aiuto del computer le seguenti disequazioni irrazionali.

13	$\sqrt{x^2 - 3x + 2} < 2x + 5$	$\left[\frac{\sqrt{253}}{6} - \frac{23}{6} < x \leq 1 \vee x \geq 2 \right]$
14	$\sqrt{-x^2 + 9} < \frac{11 - 2x}{4}$	$\left[-3 \leq x < \frac{11}{10} - \frac{\sqrt{59}}{5} \vee \frac{\sqrt{59}}{5} + \frac{11}{10} < x \leq 3 \right]$
15	$\sqrt{x + 4} < \frac{1}{5}(x - 5) + 3$	$[-4 \leq x < 0 \vee x > 5]$
16	$\sqrt{8x^2 - 16x - 48} > x + 5$	$\left[x < \frac{13}{7} - \frac{2\sqrt{170}}{7} \vee x > \frac{13}{7} + \frac{2\sqrt{170}}{7} \right]$
17	$\sqrt{x^2 + 9} < \frac{x + 6}{2}$	$[0 < x < 4]$
18	$\sqrt{x^2 - 3} > 2x - 2$	$[x \leq -\sqrt{3}]$
19	$\sqrt{x^2 + 6x} > 4$	$[x < -8 \vee x > 2]$
20	$\sqrt{5x^2 + 125} < \frac{1}{2}x - 2$	$[\exists x \in \mathbb{R}]$
21	$\sqrt{-x^2 + 4} > 2x + 2$	$[-2 \leq x < 0]$
22	$2\sqrt{x^2 - 5x + 4} < 2x - 3$	$[x \geq 4]$
23	$2\sqrt{3 - 2x - x^2} > x + 3$	$\left[-3 < x < \frac{1}{5} \right]$
24	$2\sqrt{4 + 2x + x^2} > \frac{2}{5}x - 3$	$[\forall x \in \mathbb{R}]$
25	$\sqrt{4 + x^2} < -\frac{3x + 5}{4}$	$[\exists x \in \mathbb{R}]$
26	$\sqrt{-x^2 - 20x} < 6$	$[-20 \leq x < -18 \vee -2 < x \leq 0]$
27	$\sqrt{-4x^2 + 9} > \frac{11 - 2x}{4}$	$\left[\frac{11 - 16\sqrt{2}}{34} < x < \frac{11 + 16\sqrt{2}}{34} \right]$
28	$\sqrt{4x^2 - 9} > \frac{4 - x}{2}$	$\left[x < -\frac{2\sqrt{199}}{15} - \frac{4}{15} \simeq -2,14756 \vee x > \frac{2\sqrt{199}}{15} - \frac{4}{15} \simeq 1,161423 \right]$
29	$\sqrt{3x^2 + x} > 2x - 3$	$\left[x \leq -\frac{1}{3} \vee 0 \leq x < \frac{\sqrt{133}}{2} + \frac{13}{2} \right]$

30 $\sqrt{x+4} < x-2$

$[x > 5]$

31 $\sqrt{-2+2x-x^2} < 3x-3$

$[\nexists x \in \mathbb{R}]$

32 $\sqrt{x^2-1} < x^2-4$

$\left[x < -\sqrt{\frac{\sqrt{13}}{2} + \frac{9}{2}} \simeq -2,51053 \vee x > \sqrt{\frac{\sqrt{13}}{2} + \frac{9}{2}} \simeq 2,51053 \right]$