

**ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
CORSO SPERIMENTALE P.N.I. • 2004
Sessione suppletiva**

■ **PROBLEMA 2**

Nel Liceo Scientifico «Torricelli» vi sono 4 classi quinte, i cui alunni sono distribuiti per sezione e per sesso in base alla seguente tabella:

sezzo	sezione	A	B	C	D
M		12	10	13	8
F		16	18	15	20

- a) Rappresentare graficamente la situazione per mezzo di un istogramma.
b) Calcolare le distribuzioni marginali degli studenti per sezione e per sesso.
c) Calcolare la probabilità che, scelta a caso una coppia di studenti della 5^a A, questa sia formata da alunni di sesso:

1) maschile 2) femminile 3) differente.

Quanto vale la somma delle tre probabilità trovate?.

- d) Calcolare la probabilità che, scelti a caso una classe e, in essa, una coppia di studenti, questa sia formata da alunni di sesso differente.
e) Scelto a caso un alunno di quinta del Liceo in questione e constatato che si tratta di uno studente di sesso maschile, calcolare la probabilità che esso provenga dalla 5^a D.


SOLUZIONE DELLA PROVA D'ESAME
CORSO SPERIMENTALE P.N.I. • 2004
Sessione suppletiva

PROBLEMA 2

a) In figura 5 è riportato l'istogramma che rappresenta la suddivisione degli alunni per sesso in ciascuna delle quattro classi quinte considerate.

b) Nell'insieme S degli studenti delle classi quinte del L. S. «Torricelli» consideriamo le due variabili casuali del problema:

- sesso (X), i cui valori sono M ed F;
- sezione (Y), i cui valori sono A, B, C, D.



▲ Figura 5.

Rappresentiamo le corrispondenti distribuzioni di probabilità:

X	M	F
$P(X)$	$\frac{43}{112}$	$\frac{69}{112}$

Y	A	B	C	D
$P(Y)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

Compiliamo la tabella a doppia entrata delle probabilità congiunte, ossia le probabilità delle coppie ordinate (sesso, sezione) dei possibili valori delle due variabili. Per calcolare la probabilità che uno studente abbia un dato sesso e frequenti una data sezione possiamo utilizzare una delle seguenti formule:

$$(\text{prob. di app. a una sez. data}) \times \frac{\text{num. stud. della sez. aventi un dato sesso}}{\text{num. stud. della sez.}};$$

$$(\text{prob. di app. a un sesso dato}) \times \frac{\text{num. stud. di quel sesso iscritti ad una sez. data}}{\text{num. tot. degli stud. di quel sesso}}.$$

X \ Y	A	B	C	D	somma
M	$\frac{1}{4} \times \frac{12}{28} = \frac{3}{28}$	$\frac{5}{56}$	$\frac{13}{112}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{43}{112}$
F	$\frac{69}{112} \times \frac{16}{69} = \frac{1}{7}$	$\frac{9}{56}$	$\frac{15}{112}$	$\frac{5}{28}$	$\frac{69}{112}$
somma	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	

Le distribuzioni marginali degli studenti per sezione e per sesso sono date rispettivamente dalle somme per colonne e dalle somme per righe. Dalla tabella possiamo constatare che:

- le probabilità *marginali* delle due variabili coincidono con le probabilità delle *singole* variabili ma
- le probabilità congiunte non sono uguali al prodotto delle probabilità marginali.

Per quest'ultima ragione le due variabili sono dipendenti.

- c) Per calcolare la probabilità di ciascun tipo di coppia di eventi, si utilizza il teorema della probabilità composta tenendo conto che i due eventi che formano l'evento composto sono stocasticamente dipendenti. Il procedimento adottato è schematizzato dal diagramma ad albero riportato in figura 6, in cui M ed F sono gli eventi «L'alunno è maschio», «L'alunno è femmina» rispettivamente.


La probabilità che, in 5^a A, il primo studente scelto sia un maschio è $\frac{12}{28}$, mentre la probabilità che anche il secondo lo sia è $\frac{11}{27}$.

Quindi $P(M \cap M) = \frac{12}{28} \cdot \frac{11}{27} = \frac{11}{63}$. Analogamente la probabilità

di scegliere una coppia di studenti di sesso femminile è $P(F \cap F) = \frac{16}{28} \cdot \frac{15}{27} = \frac{20}{63}$. La probabilità di

scegliere una coppia di studenti di sesso differente è la somma logica di due eventi incompatibili, quindi: $P((M \cap F) \cup (F \cap M)) = \frac{16}{63} + \frac{16}{63} = \frac{32}{63}$. Le probabilità richieste dal quesito sono $\frac{11}{63}$, $\frac{20}{63}$ e $\frac{32}{63}$

rispettivamente. La somma delle 3 probabilità trovate è 1.



- d) La probabilità E che la coppia scelta sia formata da un maschio e una femmina è la somma logica di quattro eventi composti a due a due incompatibili, infatti:

$$P(E) = P(E \cap A) + P(E \cap B) + P(E \cap C) + P(E \cap D);$$

quindi:

$$P(E) = P(A) \cdot P(E|A) + P(B) \cdot P(E|B) + P(C) \cdot P(E|C) + P(D) \cdot P(E|D)$$

$$\text{e } P(A) = P(B) = P(C) = P(D) = \frac{1}{4}.$$

Sappiamo dal punto c) che $P(E|A) = \frac{32}{63}$. Con un procedimento analogo a quello utilizzato nel punto c) otteniamo:

$$P(E|B) = \frac{10}{28} \cdot \frac{18}{27} + \frac{18}{28} \cdot \frac{10}{27} = \frac{180}{378},$$


$$P(E|C) = \frac{13}{28} \cdot \frac{15}{27} + \frac{15}{28} \cdot \frac{13}{27} = \frac{195}{378},$$

$$P(E|D) = \frac{8}{28} \cdot \frac{20}{27} + \frac{20}{28} \cdot \frac{8}{27} = \frac{160}{378},$$

Infine per il calcolo di $P(E)$ utilizziamo il diagramma ad albero di figura 7.

$$\text{Pertanto } P(E) = \frac{192 + 180 + 195 + 160}{1512} = \frac{727}{1512} \approx 0,48$$

- e) I maschi sono in tutto 43 e di questi 8 frequentano la 5^a D. La probabilità che uno studente maschio scelto fra le classi quinte provenga dalla 5^a D è pari a $\frac{8}{43}$.



▲ Figura 7.