


- 2** Una torta di forma cilindrica è collocata sotto una cupola di plastica di forma semisferica. Dimostrare che la torta occupa meno dei  $\frac{3}{5}$  del volume della semisfera.

- 2** Consideriamo il caso in cui la base superiore del cilindro retto corrispondente alla torta è tangente alla superficie interna della cupola semisferica. Fissata l'altezza, questa torta è la più grande possibile. Indichiamo i volumi della cupola e della torta con  $V_{\text{cupola}}$  e  $V_{\text{torta}}$ . Dobbiamo verificare che  $V_{\text{torta}} < \frac{3}{5} V_{\text{cupola}}$ . Questo equivale a mostrare che  $\frac{V_{\text{torta}}}{V_{\text{cupola}}} < \frac{3}{5}$ .

Cerchiamo il massimo del rapporto tra i volumi della torta e della cupola, mostrando che tale massimo è sempre minore di  $\frac{3}{5}$ .

La figura mostra una sezione verticale di torta e cupola, con il piano di sezione perpendicolare alla base della cupola e passante per il suo centro.

Indichiamo con  $R$  il raggio della cupola semisferica e con  $r$  il raggio di base della torta. Consideriamo un angolo  $\vartheta$  come indicato in figura.



■ Figura 13

Il metodo più efficiente per risolvere il quesito è considerare come incognita l'altezza  $h$  della torta.

Mostriamo la risoluzione anche nel caso in cui si scelgano come incognite il raggio  $r$  della torta oppure l'angolo  $\vartheta$ .

#### METODO 1: l'incognita è l'altezza $h$

Il volume della cupola è:

$$V_{\text{cupola}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{2}{3} \pi R^3.$$

Scriviamo il volume della torta in funzione di  $h$ .  $R$ ,  $r$  e  $h$  sono i lati di un triangolo rettangolo, quindi per il teorema di Pitagora si ha  $r = \sqrt{R^2 - h^2}$ , con  $0 \leq h \leq R$ . Calcoliamo il volume della torta:

$$V_{\text{torta}} = \pi (\sqrt{R^2 - h^2})^2 \cdot h = \pi (R^2 - h^2) \cdot h.$$

Il rapporto tra i volumi è:

$$f(h) = \frac{\pi (R^2 - h^2) \cdot h}{\frac{2}{3} \pi R^3} = \frac{3}{2} \cdot \frac{h(R^2 - h^2)}{R^3} = \frac{3}{2} \cdot \frac{R^2 h - h^3}{R^3}.$$


Studiamo massimi e minimi di  $f(h)$ . Calcoliamo la derivata prima:

$$f'(h) = \frac{3}{2R^3} \cdot (R^2 - 3h^2).$$

Studiamo il segno di  $f'(h)$  con  $0 \leq h \leq R$ :

$$\frac{3}{2R^3} \cdot (R^2 - 3h^2) \geq 0 \rightarrow R^2 - 3h^2 \geq 0 \rightarrow 3h^2 \leq R^2 \rightarrow$$

$$h^2 \leq \frac{R^2}{3} \rightarrow -\sqrt{\frac{1}{3}} \cdot R \leq h \leq \sqrt{\frac{1}{3}} \cdot R \rightarrow 0 \leq h \leq \sqrt{\frac{1}{3}} \cdot R.$$



■ Figura 14

Pertanto, per  $h = \sqrt{\frac{1}{3}} R$  il rapporto dei volumi è massimo e vale:

$$f\left(\sqrt{\frac{1}{3}} R\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{\frac{1}{3}} R \left(R^2 - \frac{1}{3} R^2\right)}{R^3} = \frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{\frac{1}{3}} R \left(\frac{2}{3} R^2\right)}{R^3} = \sqrt{\frac{1}{3}} \simeq 0,577 < \frac{3}{5}.$$

### METODO 2: l'incognita è il raggio $r$

In alternativa, è possibile risolvere il quesito considerando come incognita la variabile  $r$ , ovvero il raggio di base della torta. Il volume della cupola non dipende da  $r$ :

$$V_{\text{cupola}} = \frac{2}{3} \pi R^3.$$

Per il teorema di Pitagora si ha  $h = \sqrt{R^2 - r^2}$ , con  $0 \leq r \leq R$ . Calcoliamo il volume della torta in funzione di  $r$ :

$$V_{\text{torta}} = \pi r^2 \cdot \sqrt{R^2 - r^2}.$$

Il rapporto tra i volumi è:

$$g(r) = \frac{\pi r^2 \cdot \sqrt{R^2 - r^2}}{\frac{2}{3} \pi R^3} = \frac{3}{2} \cdot \frac{r^2 \sqrt{R^2 - r^2}}{R^3}.$$


Studiamo massimi e minimi di  $g(r)$ , con  $0 \leq r \leq R$ :

$$\begin{aligned} g'(r) &= \frac{3}{2R^3} \cdot \left[ 2r\sqrt{R^2 - r^2} + r^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{R^2 - r^2}}(-2r) \right] = \\ &= \frac{3}{2R^3} \cdot 2r \left( \sqrt{R^2 - r^2} - r^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{R^2 - r^2}} \right) = \\ &= \frac{3}{R^3} \cdot r \cdot \frac{2(R^2 - r^2) - r^2}{2\sqrt{R^2 - r^2}} = \frac{3}{2R^3} \cdot \frac{r(2R^2 - 3r^2)}{\sqrt{R^2 - r^2}}. \end{aligned}$$

Il segno della derivata coincide con quello del numeratore, poiché il denominatore è sempre positivo. Ricordando che  $0 \leq r \leq R$ , abbiamo:

$$r(2R^2 - 3r^2) \geq 0 \rightarrow 2R^2 \geq 3r^2 \rightarrow r^2 \leq \frac{2}{3} R^2 \rightarrow$$

$$-\sqrt{\frac{2}{3}} R \leq r \leq \sqrt{\frac{2}{3}} R \rightarrow 0 \leq r \leq \sqrt{\frac{2}{3}} R.$$



■ Figura 15

Pertanto, per  $r = \sqrt{\frac{2}{3}} R$  il rapporto dei volumi è massimo e vale:

$$g\left(\sqrt{\frac{2}{3}} R\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{\left(\sqrt{\frac{2}{3}} R\right)^2 \sqrt{R^2 - \left(\sqrt{\frac{2}{3}} R\right)^2}}{R^3} = \frac{3}{2} \cdot \frac{\frac{2}{3} R^2 \sqrt{R^2 - \frac{2}{3} R^2}}{R^3} = \sqrt{\frac{1}{3}} \simeq 0,577 < \frac{3}{5}.$$

### METODO 3: l'incognita è l'angolo $\vartheta$

Il volume della semisfera è

$$V_{\text{cupola}} = \frac{2}{3} \pi R^3$$

e il volume della torta è

$$V_{\text{torta}} = \pi r^2 \cdot h.$$

Come mostrato nella figura iniziale,  $r$ ,  $R$  e  $\vartheta$  sono gli elementi del triangolo rettangolo, quindi:

$$r = R \cos \vartheta \text{ e } h = R \sin \vartheta.$$

Dunque:

$$V_{\text{torta}} = \pi r^2 \cdot h = \pi (R \cos \vartheta)^2 \cdot R \sin \vartheta = \pi R^3 \cos^2 \vartheta \sin \vartheta.$$

Pertanto la funzione che esprime il rapporto tra i volumi è:

$$m(\vartheta) = \frac{\pi R^3 \cos^2 \vartheta \sin \vartheta}{\frac{2}{3} \pi R^3} = \frac{3}{2} \cos^2 \vartheta \sin \vartheta.$$

Poiché la figura è simmetrica, possiamo limitare lo studio della funzione all'intervallo  $0 \leq \vartheta \leq \frac{\pi}{2}$ . Studiamo dunque massimi e minimi della funzione  $m(\vartheta)$ , con  $0 \leq \vartheta \leq \frac{\pi}{2}$ .

Calcoliamo la derivata prima:

$$m'(\vartheta) = \frac{3}{2} [2 \cos \vartheta (-\sin \vartheta) \cdot \sin \vartheta + \cos^2 \vartheta \cdot \cos \vartheta] = \frac{3}{2} \cos \vartheta (-2 \sin^2 \vartheta + \cos^2 \vartheta).$$


Poiché  $\sin^2 \vartheta + \cos^2 \vartheta = 1$  otteniamo:

$$m'(\vartheta) = \frac{3}{2} \cos \vartheta (-2 \sin^2 \vartheta + 1 - \sin^2 \vartheta) = \frac{3}{2} \cos \vartheta (-3 \sin^2 \vartheta + 1).$$

Studiamo il segno della derivata prima in  $0 \leq \vartheta \leq \frac{\pi}{2}$ . Poiché nel primo quadrante si ha  $\sin \vartheta \geq 0$  e  $\cos \vartheta \geq 0$ :

$$\frac{3}{2} \cos \vartheta (-3 \sin^2 \vartheta + 1) \geq 0 \rightarrow -3 \sin^2 \vartheta + 1 \geq 0 \rightarrow$$

$$\sin^2 \vartheta \leq \frac{1}{3} \rightarrow -\sqrt{\frac{1}{3}} \leq \sin \vartheta \leq \sqrt{\frac{1}{3}} \rightarrow 0 \leq \vartheta \leq \arcsin \sqrt{\frac{1}{3}}.$$



■ Figura 16

Dallo schema dei segni deduciamo che per  $\vartheta = \arcsin \sqrt{\frac{1}{3}}$ , ovvero per  $\sin \vartheta = \sqrt{\frac{1}{3}}$ , il rapporto tra i volumi è massimo.

Poiché:

$$m(\vartheta) = \frac{3}{2} \cos^2 \vartheta \sin \vartheta = \frac{3}{2} (1 - \sin^2 \vartheta) \sin \vartheta,$$

il valore massimo del rapporto dei volumi è:

$$m\left(\arcsin \sqrt{\frac{1}{3}}\right) = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{3}\right) \sqrt{\frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{1}{3}} \simeq 0,577 < \frac{3}{5}.$$