

10 - Disegno dei denti

- 01 Il disegno dei denti viene sviluppato prevalentemente:**
- A in proiezione assonometrica.
 - B in proiezione ortogonale.
 - C in proiezione prospettica.
 - D in proiezione approssimata.
- 02 I denti delle due emiarcate si trovano:**
- A in posizione asimmetrica gli uni rispetto agli altri.
 - B in posizione speculare gli uni rispetto agli altri.
 - C in posizione ruotata (180°) gli uni rispetto agli altri.
 - D in posizione coincidente gli uni rispetto agli altri.
- 03 In quale sequenza si raffigurano le seguenti facce del dente, a partire dalla linea mediana?**
- A Mesiale, distale, vestibolare, linguale.
 - B Distale, vestibolare, mesiale, linguale.
 - C Linguale, distale, vestibolare, mesiale.
 - D Mesiale, vestibolare, distale, linguale.
- 04 Se dividiamo il foglio in quattro quadranti con l'intersezione di linea mediana e piano oclusale, in quale quadrante disegneremo un incisivo centrale superiore sinistro?**
- A Nel quadrante in alto a destra.
 - B Nel quadrante in alto a sinistra.
 - C Nel quadrante in basso a destra.
 - D Nel quadrante in basso a sinistra.
- 05 La vista oclusale dei vari denti:**
- A è collocata sotto la vista vestibolare.
 - B è collocata sopra alla vista vestibolare.
 - C è collocata sotto o sopra alla vista vestibolare, a seconda che il dente sia superiore o inferiore.
 - D è collocata sotto o sopra alla vista vestibolare, a seconda che il dente sia destro o sinistro.
- 06 Il sistema di proiezione utilizzato per il disegno dei denti:**
- A è il sistema europeo.
 - B è il sistema americano.
 - C è il sistema olandese.
 - D è il sistema giapponese.
- 07 Una delle scale più utilizzate per il disegno dei denti è la scala:**
- A 1:4.
 - B 1:10.
 - C 4:1.
 - D 10:1.

- | Vero | Falso | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Per il disegno dei denti umani si usano proiezioni in 4 viste (o facce). |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Per disegnare correttamente in scala 3:1 si possono dividere per tre le misure rilevate da Wheeler. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disegnando il dente 34, la faccia oclusale va posta sopra alla faccia vestibolare. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disegnando il dente 43, la faccia oclusale va posta sopra alla faccia linguale. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disegnando il dente 14, la faccia oclusale va posta sopra alla faccia vestibolare. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disegnando il dente 23, la faccia mesiale va posta a sinistra della faccia vestibolare. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Le proiezioni dei denti superiori e inferiori hanno le viste disposte allo stesso modo. |