

**11 - Caratteristiche morfologiche dei denti - denti posteriori**

- 01 **Qual è la funzione di protezione esercitata dai denti posteriori?**  
A Proteggono i denti anteriori in fase di occlusione.  
B Proteggono i denti anteriori nel movimento di protrusione.  
C Proteggono i denti anteriori nel movimento di retrusione.  
D Proteggono i denti anteriori nel movimento di lateralità.
- 02 **Quante sono le cuspidi del primo premolare superiore?**  
A 2.  
B 3.  
C 4.  
D 5.
- 03 **Quante sono le cuspidi del secondo premolare superiore?**  
A 2.  
B 3.  
C 4.  
D 5.
- 04 **Quante sono le cuspidi del primo molare superiore?**  
A 2.  
B 3.  
C 4.  
D 5.
- 05 **Quante sono le cuspidi del secondo premolare inferiore?**  
A 2.  
B 3.  
C 4.  
D 5.
- 06 **Quante sono le cuspidi del primo molare inferiore?**  
A 2.  
B 3.  
C 4.  
D 5.
- 07 **Quante sono le cuspidi vestibolari del primo molare inferiore?**  
A 2.  
B 3.  
C 4.  
D 5.
- 08 **Dalla cima delle cuspidi, verso il solco intercuspale, discendono:**  
A le creste marginali.  
B i versanti cuspidali.  
C le creste triangolari.  
D le bocche di pesce.
- 09 **Quali sono le cuspidi lavoranti (o di stampo) nei denti superiori?**  
A Le cuspidi mesiali.  
B Le cuspidi vestibolari.  
C Le cuspidi distali.  
D Le cuspidi palatali.
- 10 **Quali sono le cuspidi lavoranti (o di stampo) nei denti inferiori?**  
A Le cuspidi mesiali.  
B Le cuspidi vestibolari.  
C Le cuspidi distali.  
D Le cuspidi palatali.

- 11 Le cuspidi lavoranti dei primi molari occupano:**  
A circa il 40% del diametro linguo-vestibolare.  
B circa il 50% del diametro linguo-vestibolare.  
C circa il 60% del diametro linguo-vestibolare.  
D circa il 70% del diametro linguo-vestibolare.
- 12 Il tavolato oclusale, nei primi molari, occupa:**  
A circa il 40% del diametro linguo-vestibolare.  
B circa il 50% del diametro linguo-vestibolare.  
C circa il 60% del diametro linguo-vestibolare.  
D circa il 70% del diametro linguo-vestibolare.
- 13 La larghezza mesio-distale del primo premolare inferiore:**  
A è maggiore di quella del secondo premolare inferiore.  
B è uguale a quella del secondo premolare inferiore.  
C è minore di quella del secondo premolare inferiore.  
D è maggiore del suo diametro linguo-vestibolare.
- 14 Le misure dei molari:**  
A aumentano man mano che si procede in direzione distale (il secondo è più grande del primo; il terzo è più grande del secondo).  
B aumentano nell'arcata superiore e diminuiscono in quella inferiore.  
C rimangono costanti procedendo in direzione distale (il secondo è uguale al primo ecc.).  
D diminuiscono man mano che si procede in direzione distale (il secondo è più piccolo del primo ecc.).
- 15 Nel primo molare superiore, la cuspidi mesio-palatale:**  
A è più grande della cuspidi mesio-vestibolare.  
B è più o meno delle stesse dimensioni della cuspidi mesio-vestibolare.  
C è più piccola della cuspidi mesio-vestibolare.  
D è più piccola della cuspidi disto-palatale.
- 16 Quale, tra le seguenti particolarità anatomiche, non è presente sul tavolato oclusale di premolari e molari?**  
A Cresta marginale.  
B Cresta triangolare.  
C Fossa.  
D Cingolo.
- 17 Quante sono, nella maggior parte dei casi, le radici del primo premolare superiore?**  
A 1.  
B 2.  
C 3.  
D 4.
- 18 Quante sono le radici del primo premolare inferiore?**  
A 1.  
B 2.  
C 3.  
D 4.
- 19 Quante sono le radici del primo molare superiore?**  
A 1.  
B 2.  
C 3.  
D 4.
- 20 Quante sono le radici del primo molare inferiore?**  
A 1.  
B 2.  
C 3.  
D 4.

21 L'inclinazione dei versanti cuspidali è in genere compresa tra:

- A 10° e 30°.
- B 20° e 40°.
- C 30° e 45°.
- D 45° e 60°.

22 Nei denti posteriori, il solco intercuspale mesio-distale separa:

- A le cuspidi vestibolari da quelle linguali.
- B le cuspidi mesiali da quelle distali.
- C le cuspidi vestibolari da quelle mesiali.
- D le cuspidi linguali da quelle mesiali.

23 In quale, tra i seguenti denti, è presente un solco centro-linguale?

- A Primo premolare superiore.
- B Secondo premolare superiore.
- C Primo premolare inferiore.
- D Secondo premolare inferiore.

24 In quale, tra i seguenti denti, è presente un solco disto-vestibolare?

- A Primo molare superiore.
- B Secondo molare superiore.
- C Primo molare inferiore.
- D Secondo molare inferiore.

25 Qual è la cuspide più piccola del primo molare superiore?

- A Cuspide mesio-vestibolare.
- B Cuspide disto-vestibolare.
- C Cuspide mesio-palatale.
- D Cuspide disto-palatale.

26 Su quale dente è presente il tubercolo di Carabelli?

- A Primo premolare superiore.
- B Secondo premolare inferiore.
- C Primo molare superiore.
- D Primo molare inferiore.

Vero Falso

- I denti posteriori sono canini, premolari e molari.
- La funzione dei denti posteriori è quella di incidere e lacerare il cibo.
- I muscoli più potenti della masticazione agiscono nella zona dei denti posteriori.
- Il primo molare superiore è l'unico dente ad avere 5 cuspidi.
- Le cuspidi dei denti posteriori inferiori sono sempre in numero pari.
- I solchi possono essere solchi primari o solchi secondari.
- Le cuspidi linguali inferiori sono cuspidi bilancianti.
- Un solco di sviluppo separa due cuspidi.
- Sul primo premolare superiore è presente un solco di sviluppo mesiale.
- La cuspide disto-linguale del secondo premolare inferiore è più grande della mesio-linguale.
- La cuspide più grande del primo molare inferiore è la disto-vestibolare.
- Il primo molare superiore presenta tre fossette.
- Il ponte di smalto unisce il rilievo obliquo del primo molare superiore alla cresta triangolare della cuspide mesio-vestibolare.
- Il rapporto tra i primi molari antagonisti è definito la chiave dell'occlusione.
- Il secondo molare superiore ha due radici vestibolari e una palatale.
- I molari inferiori hanno tutti due radici.