

## 7 - Anatomia del cavo orale

- 01 **Quale parte anatomica, tra le seguenti, non fa parte del cavo orale?**  
A Palato.  
B Ugola.  
C Arco palatino.  
D Trago.
- 02 **Dietro agli ultimi molari superiori si trova/si trovano:**  
A la zona delle caruncole.  
B il palato duro.  
C i tubercoli retromolari.  
D i trigoni retromolari.
- 03 **Quale, tra le seguenti parti anatomiche, partecipa alla formazione del pavimento della bocca?**  
A Palato molle.  
B Muscolo miloioideo.  
C Istmo delle fauci.  
D Rima orale.
- 04 **Le guance comprendono i muscoli:**  
A massetere e buccinatore.  
B pterigoideo esterno e interno.  
C temporale e zigomatico.  
D tutte le risposte precedenti sono esatte.
- 05 **Il torus palatino è situato:**  
A nella parte centrale del palato duro.  
B nella volta superiore del cavo orale.  
C sulla linea mediana del palato duro.  
D tutte le risposte precedenti sono esatte.
- 06 **Quale, tra le seguenti, non è una delle funzioni cui partecipa la lingua?**  
A Deglutizione.  
B Masticazione.  
C Fonazione.  
D Respirazione.
- 07 **La lingua si divide principalmente in:**  
A radice e corpo.  
B emilingua sinistra e destra.  
C corpo e punta.  
D papille e setto.
- 08 **La secrezione della ghiandola parotide si versa all'interno del cavo orale attraverso:**  
A il dotto di Bartolini.  
B il dotto di Stenone.  
C il dotto di Wharton.  
D il dotto di Bennett.
- 09 **Il processo alveolare superiore è una protuberanza:**  
A delle ossa mascellari.  
B della mandibola.  
C delle ossa palatine.  
D degli alveoli.
- 10 **L'articolazione tra alveolo e dente è una:**  
A sinartrosi  
B condilartrosi.  
C gonfosi.  
D cifosi.

- 11 **La modifica del rapporto interarcate che si manifesta con l'età è dovuta:**  
A all'espansione del palato.  
B alla contrazione della mandibola.  
C al riassorbimento alveolare.  
D all'aumento di volume dei denti.
- 12 **La gengiva può essere distinta principalmente in:**  
A epitelio di giunzione e muco gengivale.  
B gengiva aderente e gengiva libera.  
C cercine e solco gengivale.  
D papilla interdentale e frenuli.
- 13 **I principali nervi motori dell'apparato stomatognatico fanno capo:**  
A al nervo facciale.  
B al nervo trigemino.  
C al nervo infraorbitale.  
D ai nervi mascellare e mandibolare.
- 14 **I principali nervi dell'apparato stomatognatico coinvolti nella percezione fanno capo:**  
A al nervo facciale.  
B al nervo trigemino.  
C a nessuno dei due nervi indicati in A e B.  
D a entrambi i nervi indicati in A e B.
- 15 **Da quali vasi è assicurata la circolazione sanguigna dei denti?**  
A Arterie temporali e vena temporali.  
B Arterie mascellari e vene mandibolari.  
C Arterie alveolari e vene alveolari.  
D I denti non hanno irrorazione sanguigna.
- 16 **Qual è, tra i seguenti, il nervo responsabile del movimento della lingua?**  
A Il nervo ipoglosso.  
B Il nervo linguale.  
C Il nervo glossofaringeo.  
D La corda del timpano.

- | Vero                     | Falso                    |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La commissura labiale è il punto di incontro tra il labbro inferiore e quello superiore.        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La volta superiore della bocca è composta per metà dal palato duro e per metà dal palato molle. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Il labbro inferiore presenta al centro il tubercolo.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Il palato molle è attraversato dal rafe mediano.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Il velo palatino separa la cavità orale dall'orofaringe.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La lingua fa parte del pavimento orale.   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La radice della lingua si unisce all'osso ioide.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | I muscoli intrinseci collegano la lingua alla mandibola.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Le ghiandole salivari si distinguono in maggiori e minori.                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | L'osso mascellare termina inferiormente con il processo alveolare superiore.                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Il riassorbimento del processo alveolare inferiore avviene in senso centripeto.                 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tra i denti contigui, la gengiva forma un cuscinetto detto papilla interincisiva.               |